

Tabel: onderscheid tussen decubitus en incontinentie dermatitis

criterium	decubitus	Incontinentie dermatitis	Opmerkingen
<i>oorzaak</i>	druk- en/of schuifkrachten	aanwezigheid van vocht: - urine - feces	combinatie van beide oorzaken is mogelijk en deze zullen <i>beide</i> aangepakt moeten worden
<i>locatie</i>	plekken waar de huid onder druk staat; waar bot vlak onder de huid ligt, maar ook bijv. de druk op de huid van een katheter	gebieden waar huid in contact komt met (bijtend) vocht, bijv.: - bilnaad, stuit, labia, scrotum	m.n. op stuit en in bilnaad is onderscheid moeilijk te maken, gecombineerd letsel is mogelijk
<i>kleur</i>	Algemeen: niet wegdrubbare roodheid, (bij cliënten met een donkere huidskleur blauw of paarse huid)	- wegdrubbaar óf niet - soms vlekkelig, glanzend of fel rood - roze of witte huid rond letsel: (ophoping van vocht onder huid)	rode huid (soms in combinatie met witte vlekjes) kan ook duiden op schimmelinfectie
<i>vorm</i>	meestal regelmatige vorm	- vaak grillig: verschillende oppervlakkige open plekjes - kopieletsel: ten minste 1 wond is veroorzaakt door inwerking van vocht	onregelmatige wondvormen duiden vaak op gecombineerd letsel
<i>diepte</i>	afhankelijk van decubitusgraad	- oppervlakkig - bij infectie: diepte en omvang kunnen sterk toenemen	vocht- in combinatie met schaafletsel: gescheurde huid
<i>randen</i>	- duidelijk zichtbaar - oude wonden: randen zijn verdikt	vaag en/of grillig	vocht- in combinatie met schaafletsel: gekartelde wondrand
<i>necrose</i>	mogelijk bij graad 3 en 4	geen necrose	